

9

ZEHİRLENMELER



ZEHİRLENME

Vücuda zehirli (toksik) maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır.

Vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden vücuda giren her türlü maddenin toksik olduğu varsayılır.



ZEHİRLENMELERDE GENEL BELİRTİLER

Sindirim Sistemi Bozuklukları ; Bulantı , Kusma , Karın ağrısı , İshal

Sinir Sistemi Bozuklukları ; Bilinç Kaybı , Havale , Rahatsızlık Hissi , Hareketlerde Uyumsuzluk

Solunum Sistemi Bozuklukları ; Nefes Darlığı , Morarma , Solunumun Durması

Dolaşım Sistemi Bozuklukları ; Nabız Bozukluğu , Kalp Durması



ZEHİRLENME YOLLARI

- Sindirim Yolu ile Zehirlenme** ; Kimyasal Maddeler , Bozuk Besinler , Zehirli Mantarlar , İlaç , Aşırı Alkol
- Solunum Yolu ile Zehirlenme** ; Genellikle Karbonmonoksit (Tüp Kaçakları , Şohben , Bütan Gaz Sobaları , Soba) Yapıştırıcılar , Boyalar , Ev Temizleme Maddeleri vs.
- Cilt Yoluyla Zehirlenme** ; Böcek Sokmaları , Hayvan Isırmaları , İlaç Enjeksiyonu , Zirai İlaçlar vs.



SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- ◆ Bilinç kontrolü yapılır.
- ◆ Ağız zehirli maddeyle temas etmişse su ile çalkalanmalıdır.
- ◆ Zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır.
- ◆ Yaşam bulguları değerlendirilir.
- ◆ Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir.



SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- ◆ Kusturulmaya çalışılmaz , özellikle yakıcı maddenin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmamalıdır.
- ◆ Bilinç kaybı varsa Koma Pozisyonu verilir.
- ◆ Üstü örtülür.
- ◆ **1-1-2** aranılır.
- ◆ Olayla ilgili bilgiler kaydedilir.
 - ◆ Zehirli maddenin türü,
 - ◆ İlaç yada uyuşturucu alıyor mu?
 - ◆ Hastanın bulunduğu saat,
 - ◆ Evde ne tür ilaçlar var?



SOLUNUM YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- ◆ Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam, kapı vb. açılarak ortam havalandırılır.
- ◆ Yaşamsal belirtiler değerlendirilir.(AB)
- ◆ **Yarı oturur pozisyonda** tutulur.
- ◆ Bilinci kapalı ise **Koma Pozisyonu** verilir.
- ◆ Acil tıbbi yardım için **1-1-2** aranır.



DERİ YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- ◆ Yaşam bulguları değerlendirilir.
- ◆ Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir.
- ◆ Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
- ◆ 15 - 20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanır.
- ◆ Tıbbi yardım için **1-1-2** aranır.



ZEHİRLENMELERDE GENEL İLK YARDIM KURALLARI

- ◆ Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak. (Zehirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir)
- ◆ Hayati fonksiyonların devamının sağlanması.
- ◆ En yakın sağlık kuruluşuna bildirmek (**112**).

“

*ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ*

114